

Vragen?

Heeft u nog vragen, maakt u zich zorgen of ontstaan er problemen? Neem dan contact op met uw behandelaar.

010—200 42 29 (24/7 bereikbaar)
info@kaakchirurgieholland.nl
www.kaakchirurgieholland.nl

Locaties

Capelle a/d IJssel
Hollandsch Diep 63p
2904 EP Capelle a/d IJssel

Rotterdam
Hoogstraat 99a—103a
3011 PK Rotterdam

Schiedam
Stadserf 90
3112 DX Schiedam

Vlaardingen
Fransenstraat 14a
3131 CC Vlaardingen

Zwijndrecht
Stationsplein 1
3331 LL Zwijndrecht




Klachtenregeling en Privacyverklaring op de website

Versie 2020-1



Kaakchirurgie Holland



Open antrum

Zojuist is bij u een opening tussen de mond- en kaakholte gesloten. In deze folder vindt u meer informatie over wat voor behandeling u hebt ondergaan en wat u kunt verwachten, wat u moet doen en in welke gevallen u moet bellen.

Algemene informatie


Als er bij u een tand of kies in de bovenkaak is verwijderd, zal de behandelend kaakchirurg u vragen druk in de neusbijholte op te bouwen. Dit kan door u te vragen de neus zachtjes te snuiten. De behandelaar kan zo beoordelen of er een perforatie is ontstaan in de bodem van de neusbijholte na het verwijderen van de tand of kies. Dit kan optreden als de tand of kies lange wortels heeft die reiken tot in de neusbijholte of wanneer er sprake is van een grote neusbijholte.

Als er na verwijdering een gaatje in de neusbijholtebodem ontstaat, is er sprake van een open verbinding tussen de mond- en neusbijholte die dicht moet worden gemaakt om ontsteking van de neusbijholte te voorkomen.



Er wordt dan door de kaakchirurg een soort lapje van tandvlees geprepareerd dat over de tandkas wordt gehecht. Er wordt altijd getest of hiermee de perforatie adequaat gesloten is.

Voor deze behandeling worden oplosbare hechtingen gebruikt. Tevens willen wij u graag na 10 dagen nog een keer voor controle zien om zeker te weten dat de perforatie goed afgesloten is. Vaak is dit het geval.



Afb. 1 - (L) Open antrum, (R) Lapje van tandvlees over tandkas gehecht.

Nadat u deze behandeling heeft gehad, mag u de eerste twee weken geen druk opbouwen. Dus wanneer u bijvoorbeeld moet niezen mag u de neus niet dichtknijpen of de mond dichthouden. U mag niet blazen in de zin van een ballon opblazen, want hiermee heeft u kans dat u de wond open blaast en we het weer opnieuw moeten hechten. U mag de neus wel ophalen mocht u verkouden zijn. U krijgt mogelijk een antibioticakuur en neusspray voorgeschreven.

Zorg na behandeling

Wat kunt u doen?

Om de wondgenezing goed te laten verlopen, is het belangrijk dat er geen drukverschil tussen mond, kaakholte en neus optreedt. U mag daarom gedurende twee weken niet de neus snuiten, niezen, blazen, bukken en roken.

Voor een goede genezing is een schone mond belangrijk. U mag uw tanden gewoon poetsen. U doet er beter aan een week niet te roken.

Zolang de hechtingen aanwezig zijn, wordt spoelen met zout water aanbevolen (een halve theelepelt zout in één kopje water).

De zwelling van de wang kunt u beperken door de wang goed te koelen met een coldpack of een washand gevuld met een plastic zakje met ijsblokjes of een ander koud element, zoals diepvrieserwtjes.

Wanneer u een antibioticakuur krijgt, dient u deze kuur altijd af te maken.

Het is verstandig contact op te nemen met ons als:

- u koorts krijgt boven 39°C (een geringe verhoging is normaal).
- na vier of vijf dagen de pijn en/of zwelling toeneemt.
- de wond blijft bloeden, ondanks de reeds genoemde maatregelen.

Heel. Mooi. Beter.